

Pleurothallis Wolfiana Schltr., n. sp.

Epiphytica, erecta, c. 15 cm alta; rhizomate decumbente, brevi; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; caulis 0,5—1,5 cm distantibus, erectis, e basi attenuata apicem versus sensim dilatatis, acute triquetris, unifoliatis, 6—10 cm longis, infra apicem c. 4 mm latis; folio oblongo-elliptico, obtuso, 5,5—7,5 cm longo, medio fere 2,5—3,3 cm lato, carnosulo; racemo vulgo singulo, leviter immerso, e spatha ancipiti acuta c. 7 mm

longa, sublaxe 4—7-floro, usque ad 3 cm longo, folio incumbente; bracteis ovatis, acuminatis, ovarium breve subaequantibus; floribus illis *P. chameensis* Ldl. similibus sed bene minoribus, glabris; sepalis anguste oblongis, subacutis, 6,5 mm longis, lateralibus obliquis, tertia parte basilari connatis; petalis anguste rhombeo-ligulatis, apiculatis, dimidio superiore margine grosse serratis, 3,5 mm longis, obliquis; labello oblongo-linguiformi, obtuso, margine apicem versus minutissime serrulato, basi breviter unguiculiformi-contracto, 3,5 mm longo, supra basin 1 mm lato; nervo medio carinato-inerassatulo; columna graciliore, c. 3 mm alta, clinandrio tilobulato, lobulis lateralibus triangulis, subacutis, dorsali oblongo-quadrato, duplo majore apice denticulato, pede brevi, crasso; ovario cylindraceo, glabro, c. 2 mm longo.

Chimborazo: In silvis prope Puente de Chimbo. — Sodiro, Majo.

Eine nahe Verwandte der *P. chameensis* Ldl. aber mit bedeutend kleineren Blüten und viel schmälerer, am Grunde fast nagelartig zusammengezogener Lippe. Auch die Säule zeigt bei beiden Arten deutliche Verschiedenheiten.

Ich widme die Art dem besten Kenner des Andengebietes von Ecuador, Herrn Theodor Wolf.