

**P. verecunda** Schltr., nov. spec.

Epiphytica, erecta, c. 20 cm alta'; rhizomate valde abbreviato; caulis  
bus valde approximatis, teretibus, vaginis 3 alte amplectentibus dimidio  
Inferiore obtectis, 10—12 cm longis, 2 mm diametentibus; folio erecto,  
ianceolato-ligulato vel anguste lanceolato, acuminato, basi cuneato,  
sessilio, carnososo-coriaceo, 8,5—10 cm longo, medio fere 1—1,4 cm lato;  
inflorescentiis erectis vel arcuatis, folio fere duplo brevioribus, pedunculo  
paucivaginulato, usque ad 3 cm longo, racemo laxe pauci- (2—4-) floro:  
bracteis cucullato-ovalibus, acuminatis, ovario pedicellato paulo brevioribus  
vel subaequilongis; floribus in genere mediocribus, carnosulis, glabris,  
purpureis; sepalo intermedio anguste oblongo, acuto, 6 mm longo, 3-nervio,  
nervo medio extus incrassato, lateralibus oblique et anguste oblongis.  
acutis, extus nervo medio carinato-incrassatis, intermedio aequilongis.  
usque infra medium connatis; petalis quam sepala fere duplo minoribus.  
oblongo-ligulatis, acutis, tertia parte apicali paulo dilatata marginibus  
irregulariter denticulatis, uninerviis; labello e basi angustiore quadrata  
ima basi auriculata e tertia parte basilari subito in laminam semioblongam  
obtusam basi truncatam apicem versus verruculosam dilatato, petalis  
fere aequilongo; columna leviter curvata, petalis paulo breviore, clinandrio  
lacerato; ovario cum pedicello subaequilongo c. 3 mm longo, glabro.

Panama: Auf Hügeln bei Panama-City — no. 91.

Nach der Cogniauxschen Einteilung der Gattung wäre die Art  
wohl zu den *Sarcodanthae-Brachystachyae* zu rechnen, doch bin ich nicht  
imstande, nähere Verwandte anzugeben. Durch den Habitus, die kurz-  
gestielten purpurroten Blüten und die Form der Lippe ist sie recht gut  
charakterisiert.