

666. *Chondrorhyncha Reichenbachiana* Schltr. n. ov. spec. — *Epiphytica acaulis*, erecta, 23—30 cm alta; rhizomate valde abbreviato; radieibus filiformibus, flexuosis, glabris; foliis in quoque surculo c. 2—3. erecto-patentibus, basi vaginis c. 4 protectis, anguste lanceolatis, acuminatis, basin versus sensim subpetiolato-angustatis, 12—18 cm longis, supra medium 1—2 cm latis; inflorescentiis in axillis vaginalium singulis natis, erecto-patentibus vel patentibus, unifloris, pedunculo c. 3 cm longo. tenui, supra basin paucivaginato; bractea ovata, breviter acuminata vel apiculata, ovario pedicellato subtriplo breviore; flore in genere inter minores, fide collectoris lacteo, labello flavido, brunneo-punctulato; sepalis oblongo-ligulatis, obtusiusculis, glabris, c. 2 cm longis, lateralibus obliquis, reflexis; petalis oblique rhomboe-ellipticis, obtusis, basi manifeste decurrentibus, quam sepala aequilongis, sed manifeste latioribus, glabris; intus basi sparsim brunneo-punctulatis; labello obovato, integro, leviter concavo, ante rotundato breviter exciso, margine subcrenulato-crispulo, supra medium incrassatione lata depressa, transversa, obtuse bilobulata, margine breviter et distanter erosulo-denticulata ornato, glabro, 2;2 cm longo, supra medium 1,5 cm lato; columna semitereti, apicem versus paulo dilatata, 1,5 cm longa, pede satis longo, minute puberulo; ovario pedicellato glabro, pedicello inclusu c. 1,5 cm longo.

Costa Rica: Catarctas — Endres no. 557 (in Herb. Reichenbach), blühend März bis August. — Eine verhältnismäßig kleinblumige Art, welche durch die sehr breite, die ganze Mitte der Lippe von Rand zu Rand einnehmende Schwiele sehr gut charakterisiert ist und mit keiner der übrigen, bis jetzt beschriebenen wirklich näher verwandt zu sein scheint.