

en dehors, concaves en leur face intérieure.

E S P È C E S.

1. LIMÉOLE à feuilles oblongues; *Limeum africanum*. L. *Limeum foliis oblongis petiolatis*. L. F. Suppl. 214.

Limeum africanum. Gært. Fruct. p. 367. t. 76. f. 5.

Cette plante a le port de la Corrigiole ou du Téléphe: ses tiges sont foibles, couchées, longues d'environ sept pouces, anguleuses, nues, persistantes à leur base. Les feuilles sont alternes, distantes, petites, oblongues ou linéaires-lancéolées, un peu pétiolées. Les corymbes sont terminaux, solitaires, nuds, composés, à pédoncules un peu longs. Cette plante croît dans l'Ethiopie, au Cap de Bonne-Espérance. ☞.

2. LIMÉOLE à feuilles ovales; *Limeum aphyllum*. L. F. *Limeum foliis ovatis sessilibus*. L. F. Suppl. 214.

Cette espèce paroît nue ou dépourvue de feuilles; ses feuilles sont ovales, sessiles. Elle croît au Cap de Bonne-Espérance.

LIMODORE; *LIMODORUM*. Genre de plante unilobée, de la famille des Orquidées, qui a de très-grand rapports avec les Elleborines, & qui comprend des herbes exotiques, à feuilles alternes, simples, engainées ou amplexicaules & à fleurs disposées en épi ou en grappe terminale.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir une corolle à six pétales: savoir, trois extérieurs, & trois autres intérieurs, dont un inférieur est concave. Le corps caverneux du pistil allongé, & en éperon court à sa base.

C A R A C T È R E G È N È R I Q U E.

La fleur est incomplète: elle offre 1°. une corolle de six pièces, dont trois sont extérieures, lancéolées, ouvertes; & trois autres sont intérieures, desquelles une inférieure est plus large, & concave; (Linnæus dit mal-à-propos qu'elle est pédicellée).

2°. Deux étamines situées au sommet intérieur du corps caverneux du pistil, & qui consistent en deux filets fort courts, portant des anthères ovales-arrondies;

3°. Un ovaire inférieur, allongé ou en colonne, duquel s'élève dans la fleur un style ou corps oblong, légèrement arcqué, produisant une bosse ou un éperon court à sa base, creux ou caverneux supérieurement, à stigmate presque labié.

Le fruit est une capsule inférieure, colonnaire ou prismatique, tricarinée, trivalve, uni-

loculaire, s'ouvrant par ses angles, contenant des semences nombreuses & scobiformes.

E S P È C E S.

1. LIMODORE pourpre; *Limodorum purpureum*. *Limodorum floribus imberbibus pedunculatis alternis subracemosis, foliis nervosis ensiformibus*.

Limodorum... H. R. P. *Helleborine purpurea, tuberosa radice*. Plum. Spec. 9.

Sa racine est tubéreuse: ses feuilles sont au nombre de 2 ou 3, ensiformes, nerveuses comme celles du *Gladiolus plicatus*, longues de 9 à 10 pouces, & larges d'un pouce ou environ. La tige est nue dans la plus grande partie de sa longueur, pourprée, grêle, haute de 12 à 15 pouces, munie de quelques écailles rares fort petites & pointues. Elle porte à son sommet 4 ou 5 fleurs alternes, lâches un peu pédonculées, assez grandes, & d'un pourpre vif. La corolle de ces fleurs consiste 1°. en trois pétales extérieurs dont les deux inférieurs sont ovales-pointus un peu auriculés d'un côté à leur base, & le supérieur lancéolé; 2°. en trois pétales intérieurs dont les deux latéraux sont ovales-lancéolés, tandis que le troisième est inférieur, plus large, trilobé, imberbe, & muni de plis jaunes dans sa partie moyenne. Cette plante est cultivée depuis long-temps au Jardin du Roi, où on la prend pour le *Limodorum tuberosum* de Linné; on la tient dans la serre chaude. Elle croît dans les Antilles & les pays chauds de l'Amérique. (v. v.) ☞.

2. LIMODORE barbue; *Limodorum barbatum*. *Limodorum floribus barbatis sessilibus alternis subspicatis, folio angusto erecto solitario*.

An *Limodorum tuberosum*. Lin. *Synonymis martyni, Milleri & Plumieri exclusis?*

Sa racine, qui n'offre presque aucune tuberosité, est garnie de fibres simples, très-menues. Elle pousse une tige grêle, enveloppée à sa base par 2 ou 3 gaines alternes, nues; & dans la partie inférieure cette tige est munie d'une feuille engainée, linéaire-ensiforme, étroite, droite, un peu nerveuse, & moins longue que la tige. Les fleurs sont sessiles, alternes, purpurines, & disposées au nombre de 5 ou 6, presque en épi terminal. Elles sortent chacune de l'aisselle d'une écaille lancéolée aiguë; & sont remarquables par le troisième des pétales intérieurs qui est très-barbu dans sa partie moyenne. Cette plante croît dans le Canada, d'où nous en avons reçu des exemplaires desséchés. (v. f.).

3. LIMODORE élevé; *Limodorum alium*. L. *Limodorum floribus imberbibus pedunculatis sparsis numerosissimis, scapo laterali aphylo, Helleborine radice arundinacea, foliis am-*