

79. **Ornithidium Tonduzii** Schltr., nov. spec.

Terrestre erectum, validum; caule tereti glabro, omnino vaginis foliorum persistentibus obtecto, dense foliato; foliis erecto-patentibus patentibusve ligulatis obtusis, apice inaequalibus, glabris, textura coriaceis, 12—18 cm longis, medio fere 2,5—3 cm latis; floribus in axillis foliorum fasciculatis; pedunculis vaginulis paucis laxe amplectentibus obsessis; bractea vaginis omnino conformi, ovarium vulgo excedente; floribus in genere mediocribus erecto-patentibus; sepalis lanceolatis acutis, glabris, c. 1,3 cm longis, lateralibus obliquis; petalis sepalis similibus paulo obliquis, apice acutis, c. 1 cm longis; labello e basi contracta cymbiformi excavato, deinde in tertia parte apicali paulo attenuato, in lobum oblongum obtusum apicalem, minute papillosum extenso, omnino 0,6 cm longo, linea elevata basi breviter bicuspidata apice in callum trilobulatum exeunte e basi labelli usque in medium decurrente; columna recta labello paulo breviore, pede brevi anthera altius cucullata antice leviter retusa; polliniis oblique pyriformibus, glandula brevi transversa; ovario cylindraceo, glabro, c. 0,6 cm longo.

Costa-Rica: An den Ufern des Rio Angel (Poas), c. 2600 m ü. d. M.
— Ad. Tonduz no. 10770; blühend im Oktober 1896.

Diese Art ist offenbar mit *Ornithidium fulgens* R. f. verwandt. Über die Färbung der Blüten liegen leider keine Notizen vor. Eine Identität beider Arten halte ich für ausgeschlossen, da in dem Labellum zwischen ihnen bedeutende Abweichungen vorhanden scheinen.