

165. **Ornithidium Biolleyi** Schltr., nov. spec.

Epiphyticum, erectum, validum 40—50 cm altum, ebulbosum; radicibus filiformibus elongatis, flexuosis, glabris; caule omnino vaginis foliorum imbricantibus oblecto, crasso; foliis erecto-patentibus ligulatis obtusis, inaequaliter bilobulatis, glabris, textura coriaceis, vagina exclusa 11—14 cm longis, medio fere 1,8—2,5 cm latis; floribus in axillis foliorum fasciculatis, albis; pedunculis gracillimis, vaginulis paucis obsessis, 5—7 cm longis; bractea lanceolata acuminata, ovarium superante; sepalis lanceolatis acuminatis, glabris, c. 1,1 cm longis, lateralibus paulo obliquis; petalis sepalis similibus subaequilongis, oblique lanceolatis, acuminatis glabris; labello breviter unguiculato, circuitu oblongo obscure trilobato, 0,6 cm longo, lobis lateralibus erectis auriculiformibus, callo reniformi obtusissimo glabro, supra basin; columna brevi, glabra, pede brevi; anthera cucullata glabra, antice excisa; polliniis oblongoideis, stipite late lineari polliniis longiore, glandula transversa reniformi; ovario cylindrico glabro, 0,6 cm longo.

Costa-Rica: Auf Bergen in der Umgebung von San Jose. — Riolley no. 1052.

Durch das Labellum vor den anderen kostarizensischen Arten gut gekennzeichnet.