

190. **Ornithidium bracteatum** Schltr., nov. spec.

Epiphyticum, robustum; rhizomate erecto vel accedente, crasso, vaginis amplis, persaepe foliaceis obtecto, laxe pseudobulbis obsessis; radicibus filiformibus, elongatis, flexuosis, glabris; pseudobulbis erectis vel suberectis, i. e. rhizomati subparallelis, valde compressis, oblongis, unifoliatis, 2,5—3 cm longis, medio fere 1—1,5 cm latis; folio erecto, ligulato, apice inaequaliter et obtuse bilobulato, glabro, textura coriaceo, 8—15 cm longo, medio fere 1,5—2,5 cm lato; floribus pro genere inter majores, fasciculatis, pseudobulbos plus duplo superantibus; pedicellis gracilibus; vaginis paucis, ovato-lanceolatis, acutatis, amplis laxe obsessis; bracteis amplis ovatis, breviter acuminatis vel apiculatis, ovarium amplectentibus et paulo superantibus; sepalis ligulatis, subacutis, glabris, 1,7 cm longis, medio 0,4 cm latis, lateralibus paulo obliquis; petalis sepalis similibus, tamen paulo brevioribus et dimidio superiore magis angustatis; labello parvulo, e basi cuneata dimidio superiore trilobato, lobis lateralibus rotundatis obtusis, abbreviatis, intermedio producto oblongo obtuso, multo longiore, callo mediano antice exciso, medio carinato, e basi labelli usque ad basin lobi intermedii, labello toto c. 1,2 cm longo, infra medium 0,5 cm lato, lobo intermedio 0,6 cm longo; columna 0,4 cm alta, glabra, pede brevi, ovario cylindrico, glabro, c. 1,3 cm longo.

Costa-Rica: Bei La Palma, c. 1520 m ü. d. M. — A. Tonduz no. 12344, blühend am 22. Mai 1898.

Diese Art gehört infolge ihrer Tracht wohl in die Nähe des *O. densum* Ldl., das aber ganz bedeutend kleinere Blüten hat.