

148. **Camaridium Tonduzii** Schltr., nov. spec.

Epiphyticum, ramosum, pluricaule, ebulbe; caulis crassiusculis, teretibus, densius foliatis, omnino vaginis foliorum arcte appressis obtectis c. 0,7 cm diametentibus; foliis erecto-patentibus, ligulatis, apice inaequilater bilobulatis, glabris, textura coriaceis, 5—9 cm longis, medio fere 0,9—1,9 cm latis; floribus ex axillis foliorum 3—4-nis erectis; pedunculis foliis duplo vel plus duplo brevioribus, vaginis c. 4, alte amplectentibus bene obtectis, teretibus glabris; floribus in genere inter majores, illis *C. Biolleyi* Schltr. fere aequimagnis; sepalis lanceolatis acutis glabris, c. 1,5 cm longis, lateralibus paulo obliquis; petalis sepalis subaequilongis similibusque, anguste lanceolato-ligulatis, obliquis, subacutis, glabris; labello e basi cuneata tertia parte apicali trilobo, lobis ovato-triangulis obtusis, intermedio lateralibus paulo longiore, labello toto 0,7 cm longo, ad apices loborum lateralium 0,5 cm lato, callo anguste oblanceolato excavato in medio, verrucisque sparsis in basi labelli; columna semitereti, leviter curvata, labello paulo breviore, pede brevi, glabra; polliniis oblique oblongoides, stipite subquadrato, glandula transversa parvula; ovario cum pedicello cylindraceo, glabro, 1,2 cm longo, bractea ovato-lanceolata convoluta aequilonga.

Costa-Rica: Auf einem Baume auf einem Weideplatze bei La Palma, c. 1550 m ü. d. M. — A. Tonduz no. 12429, blühend im August 1898.

Die vorliegende Art ist zwar habituell dem *C. Biolleyi* Schltr. nicht unähnlich, zeichnet sich aber durch das Labellum aus.