

78. **Camaridium costaricense** Schltr., nov. spec.

Epiphyticum erectum, validum, usque ad 40 cm altum; caule ramoso tereti, dense foliato, vaginis foliorum arcte amplectentibus omnino obtecto; foliis ligulatis obtusis, apice breviter excisis, glabris, textura coriaceis, 5—10 cm longis, medio fere 0,8—1,5 cm latis; floribus axillaribus vulgo singulis interdum 2—3-nis; pedunculo flexuoso vaginulis 3—4 laxius amplectentibus obtecto, c. 2,5 cm longo; bractea vaginis omnino aequali ovario aequilonga; floribus in genere mediocribus erectis; sepalis lanceolatis acutis, glabris, 1,5 cm longis, lateralibus paulo obliquis; petalis sepalis valde similibus acutis, glabris, fere aequilongis; labello e basi late cuneata trilobo, lobis ovatis obtusis, intermedio lateralibus paulo majore, verrucis sparsis in tertia parte basilari labelli, callo linearis apicem versus paulo dilatato excavato in medio labello usque ad basin lobi intermedii decurrente, labello toto 0,7 cm longo, ad apices loborum lateralium 0,5 cm lato; columnae pede brevi; polliniis oblongoideis, stipite quadrato haud elongato, glandula brevi transversa; ovario cylindraceo, glabro, c. 1 cm longo.

Costa-Rica: Auf einem Baume eines Weideplatzes bei La Palma, c. 1550 m ü. d. M. — A. Tonduz no. 12429; blühend im August 1898.

Trotz des nicht sehr langen Stieles der Pollinien bringe ich die Pflanze zu *Camaridium*, da sie auch habituell besser zu diesem passt.