

Camaridjum dendrobioides Schltr. n. sp.

Epiphyticum, erectum gracile, simplex vel parum ramosum, usque ad 45 cm altum; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; caulis simplicibus vel parum ramosis, erectis, bene foliatis, vaginis foliorum arcte amplectentibus omnino obtectis, c. 2 mm diametro; foliis patentibus vel erecto-patentibus, lineari-ligulatis, obtuse et inaequaliter bilobulatis, glabris, 3—5 cm longis, medio fere 3,5—6 mm latis; inflorescentiis in axillis vaginalium caulis natis, unifloris, pedunculo paucivaginulato, usque ad 3 cm longo; bractea cucullata, acuta, ovarium subduplo superante; floribus in genere vix inter mediocres, glabris; sepals ligulatis, obtusis, c. 9 mm longis, lateralibus obliquis; petalis oblique lineari-ligulatis, obtusis, quam sepala paulo brevioribus; labello oblongo-ligulato, obtuso, medio margine sublobato-dilatato, callo linearis antice bilobulato tertia parte basilari ornato, nervis 3 parallelis carinato-incrassatis antepositis, 7 mm longo, medio fere 4 mm lato; columna semitereti, mediocri, 3,5 mm longa, glabra, pede brevi; ovario subsessili, cylindraceo, glabro, 4 mm longo.

Costa Rica: Forêts des collines de San Ramon, 1500 bis 1600 m. — A d. Tonduz (n. 17620 herb. Mus. Nation. Costa Rica), Mai 1913.

Mit *C. luteorubrum* Ldl. und *C. Jimenezii* Schltr. am nächsten verwandt. Von beiden durch die weniger dicht stehenden etwas längeren Blätter und die Form des Labellums gut unterschieden. Vor *C. Jimenezii* Schltr. zeichnet sie sich auch aus durch den viel schlankeren Wuchs und die bedeutend spärlichere oft ganz fehlende Verzweigung der Stämme.