

107. **Ornithidium costaricense** Schltr., nov. spec.

Epiphyticum erectum, ut videtur ebulbosum, validum, c. 30 cm et ultra altum; radicibus filiformibus elongatis, flexuosis, glabris; caulis viginis foliorum imbricantibus dense obtectis; foliis erecto-patentibus ligulatis obtusis inaequaliter bilobulatis, glabris, textura coriaceis, vagina exclusa 5—10 cm longis, medio fere 1,3—2 cm latis; floribus in axillis foliorum fasciculatis, illis *O. gigantei* Ldl. similibus; sepalis lanceolato-oblongis acutis, glabris, c. 1,7 cm longis, lateralibus paulo obliquis; petalis lanceolato-ellipticis subacutis, obliquis, glabris, sepalis subaequilongis; labello e basi subunguiculata cuneato, c. 1 cm longo, trilobo, lobis lateralibus falcato-oblongis obtusis, intermedio ovato obtuso, carnosulo nunc lateralibus aequilongo, nunc paululo breviore, lamellis 3 parallelis approximatis e basi labelli usque ad basin lobi intermedii decurrentibus; columna gracili, anthera cucullata; polliniis oblongis, stipite late lineari, polliniis paulo longiore, glandula transversa; ovario cylindrico glabro, 0,8 cm longo.

Costa Rica: In Wäldern bei Rancho-Flores, c. 2040 m ü. d. M. — H. Pittier no. 2177, blühend im Februar 1890.

Eine sehr interessante Art, durch welche gewissermassen wieder nähere Beziehungen zu *Camaridium* zutage treten. Die Form des Labellums zeichnet sie vor den verwandten aus.