

206. *Ornithidium parvulum* Schltr., nov. spec.

Epiphyticum, ramosum, pusillum; rhizomate laxe pseudobulbis ob-
sesso, vaginis amplexantibus oblecto, dichotome ramoso; pseudobulbis
compressis oblongis, unifoliatis, c. 1 cm longis, medio fere 0,3—0,4 cm
latis; folio erecto oblongo-ligulato, obtuso vel inaequaliter bilobulato,
glabro, textura coriaceo, c. 3,5 cm longo, medio fere 0,6 cm lato; floribus
in rhizomate natis erectis, in genere inter minores, nutantibus, pedun-
culo 0,6—0,7 cm longo, vaginis paucis amplexantibus, acutis oblecto;
bractea erecta acuta, ovarium amplexante et superante; sepalis lanceo-
latis acutis, glabris, 0,8 cm longis, lateralibus paulo obliquis; petalis
oblique ligulatis obtusiusculis, glabris, sepalis paulo brevioribus; labello
circuito oblongo-ligulato, obtuso, glabro, infra medium trilobo, lobis
lateralibus abbreviatis obtusis, intermedio multoties longiore oblongo,
labello toto 4,5 mm longo, infra medium vix 0,2 cm lato, lobo inter-
medio 2,5 mm longo, callo oblongo supra basin labelli; columna semi-
tereti 0,2 cm longa, glabra, pede 0,1 cm longo; ovario cylindrico, glabro,
c. 0,3 cm longo.

Costa-Rica: In den Wäldern von La-Palma, c. 1700—2000 m ü. d. M.
— A. Tonduz no. 9670, blühend im Juli 1895.

Diese sehr kleine Art der Gattung erinnert in ihren Blüten etwas
an *O. densum* Ldl., doch ist sie im Habitus gar nicht mit diesem zu
vergleichen und neigt sich eher dem *O. anceps* Rehb. f. zu.