

Ornithidium stenophyllum Schltr., nov. spec.

Epiphyticum, parvulum, ad 10 cm altum; rhizomate decumbente vel patulo, vaginis arcte amplectentibus omnino oblecto, usque ad 3 mm diametiente; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; pseudobulbis 1,5—2 cm inter se distantibus, oblique ovatis, unifoliatis, compressis, 8—12 mm longis, infra medium usque ad 6 mm latis; folio erecto, lineari, acutiusculo, basin versus angustato, usque ad 7,5 cm longo, medio fere ad 4 mm lato; inflorescentiis juxta basin pseudobulborum natis, abbreviatis, subsessilibus, capitiformi-confertis, pedunculis perbrevis, vaginis paucis omnino oblectis, unifloris; bractea lanceolata, acuminata, ovarium dimidio fere superante; flore in genere minuto, glabro, ut videtur albido; sepalis anguste oblongis, apiculatis 3-nerviis, c. 3 mm longis, lateralibus obliquis, 6-ta parte basilari inter se connatis; petalis oblique linearibus, apiculatis, quam sepala subaequilongis, 3-nerviis; labello ex ungue brevi carnosulo abrupte in laminam circuitu rhombeo-ovatum leviter 3-lobatam expanso, vix 2 mm longo, medio fere vix 1,25 mm lato, lobis lateralibus in medio laminae lamelliformi insilientibus obtusatis, intermedio triangulo-ovato, obtuso, antico; columna perbrevis, glabra, pede brevi sed distincto; ovario cylindraceo, glabro, vix 1,5 mm longitudine excedente.

Costa Rica: San Jeronimo — C. Wercklé no. 109, blühend im Juni 1922.

Eine Art aus der näheren Verwandtschaft von *O. anceps* Rehb. f., von diesem aber gut getrennt durch die sehr schmalen Blätter, kleinere Blüten und die Form der Lippe. Die Rhizome scheinen meist nur am Grunde zu wurzeln.