

*Camaridium vittariifolium* (L. O. Williams) M. A. Blanco, *comb. nov.*

Basionym: *Maxillaria vittariifolia* L. O. Williams, Ceiba 4: 38. 1953.

Other members of *Camaridium* include *C. adolphii* Schltr., *C. amparoanum* Schltr. (*Maxillaria serrulata* Ames & Correll), *C. biolleyi* (Schltr.) Schltr., *C. bracteatum* (Schltr.) Schltr., *C. bradeorum* Schltr., *C. brenesii* Schltr. (*M. trilobata* Ames & C. Schweinf.), *C. costaricense* Schltr. (*M. tonduzii* (Schltr.) Ames & Correll), *C. ctenostachys* (Rchb.f.) Schltr., *C. dendrobioides* Schltr., *C. dichotomum* Schltr., *C. hoehnei* Pabst (*M. imbricata* Barb. Rodr.), *C. imbricatum* Schltr. (*M. schlechteriana* J. T. Atwood), *C. latifolium* Schltr. (*M. planicola* C. Schweinf.), *C. minus* Schltr. [*M. minor* (Schltr.) L. O. Williams], *C. nutantiflorum* Schltr. (*M. umbratilis* L. O. Williams), *C. ochroleucum* Lindl. (*M. camaridii* Rchb.f.), and *C. pulchrum* Schltr.