

**Campylocentrum** Bth.**Campylocentrum acutum** Schltr., nov. spec.

Epiphyticum, subpatulum, c. 14 cm longum; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; caule simplici, leviter flexuoso, tereti, bene foliato, vaginis foliorum persistentibus, arcte amplectentibus, striato-nervosis omnino obtecto, c. 3,5 mm diametro; foliis subpatentibus, oblique oblongo-ligulatis, subacutis, basin versus sensim paulo angustatis, 3—3,7 cm longis, medio fere 8—10 mm latis; inflorescentiis erecto-patentibus, pedunculo brevissimo, basi 2—3-vaginulato, racemo pro genere laxo, 12—15-floro, rhachi glabra; bracteis ovatis acutis, ovario 2—3-plo brevioribus; floribus parvulis, niveis, glabris; sepalis oblongo-lanceolatis, acutis, uninerviis, c. 1,5 mm longis; lateralibus obliquis; petalis oblique lanceolatis, acutis, uninerviis, quam sepala subaequilongis; labello e basi semiovali supra medium manifeste trilobo, 1 mm longo, medio fere 0,7 mm lato, 7 nervio, lobis lateralibus brevibus, oblique triangulis obtusis, intermedio multo majore, angustius triangulo, valde acuto, calcare curvato, apicem versus paulo ampliato, obtuso, 1,25 mm longo; columna brevissima, generis; ovario cylindraceo, glabro, c. 1,5 mm longo.

Costa Rica: Arbres des bois, paturages et des haies, Santiago de San Ramon, alt. 1075—1100 m — A. M. Brenes no. 147, XI. 1921. Semipendante. Fleurs petites, blanches.

Habituell besitzt die Spezies eine gewisse Ähnlichkeit mit *C. Schiedei* Rehb. f. von Mexiko, jedoch stehen die Blüten in lockeren Trauben. Außerdem besitzt die Spezies als besondere Merkmale spitze Sepalen und Petalen, ein deutlich dreilappiges Labellum mit auffallend spitzem Vorderlappen und einen leicht gekrümmten stumpfen Sporen, der etwas länger ist als die Lippenplatte.