

124. **CAMPYLOCENTRUM CORNEJOI** Dodson, sp. nov.

Species haec C. micranthi (Lindl.) Rolfe similis, sed inflorescencia laxiflora, floribus minoribus, sepalo dorsali ad 3 mm. longo, et calcare deorsum leviter antrorso, quam sepalis brevior distinguitur.

MATERIAL ORIGINAL: Cornejo & Bonifaz 3634; Ecuador, El Oro, Hacienda Daucay, antes de Limón Playa, río Dumari, 450 m., 20 de noviembre de 1994 (GUAY holotipo).

ETIMOLOGÍA: Nombrado en honor del Sr. Javier Cornejo quien participó en el descubrimiento de la especie.

OTROS EJEMPLARES VISTOS: Se conoce sólo el material tipo.

Epífita. Tallo delgado, de hasta 20 cm de largo, totalmente ocultado por vainas foliares conduplicadas, con hojas deciduas en los 6 cm inferiores, portador de raíces alargadas por todo el largo salvo en la porción apical. Hojas numerosas, dísticas, patentes, angostamente oblongo-elípticas, obtusas en el ápice, ligeramente contraídas en base sésil, de hasta 6 x 2 cm. Inflorescencias laterales, racemosas, casi iguales a las hojas, perforan el centro de las vainas foliares, con 11 a 17 flores, las flores ampliamente espaciadas, con separación de hasta 3 mm, con largo de hasta 6 cm, glabras; pedúnculo filiforme, de hasta 5 mm de largo. Flores pequeñas, blancas, los sépalos y pétalos conniventes; los sépalos similares, libres, angostamente ovados, obtusos, con pelos estrigosos esparcidos en la superficie exterior, de hasta 3 x 1 mm; los pétalos oblongos, obtusos, de hasta 3.5 x 1 mm; el labelo conspicuamente espolonado, la lámina elíptica, con lóbulos laterales, anchos y rectangulares, de 4.5 x 3 mm; el espolón más corto que los sépalos, dirigido hacia abajo y ligeramente encorvado hacia adelante con respecto al plano del labelo, ligeramente dilatado hacia el ápice, de

2 mm de largo; la columna sin capucha del clinandrio; polinios 2, globosos, duros, amarillos.

NOTAS: *Campylocentrum cornejoi* se distingue de las otras especies del grupo *C. micranthum* por la espolón relativamente pequeño, más corto que los sepalos y dirigido hacia abajo y curvado ligeramente hacia el ápice del labio, y también por las flores separadas ampliamente en el raquis.