

12 - *Capanemia riograndensis* n. sp.

Lámina. III, fig. C.

Epiphytica, pusilla, c. 15 mm. alta tantum; *radicibus* filiformibus, flexuosa, glabris, cinereis; *rhizomate* valde abbreviato; *pseudobulbis* oblongis, minutis, in sicco longitudinaliter sulcatis, utrinque vaginis binis, pseudobulbis aequilongis laxe cladis. 3 mm. altis, 1.5 mm. crassis; *folio* aciculato, paululo curvato, 10-12 mm. longo, 0.7 mm. crasso; *inflorescencia* erecta, quam foliis dimidio breviora, triflora; *floribus* minutissimis, patulis, albidis; *sepalo* dorsali anguste lanciforme, uninervato, tertio superiore tantum carinato, 2 mm. longo, 0.6 mm. lato; lateralibus fere lanceolatis, obscure sygmoideis, 2 mm. longis, 0.6 mm. latis; petalis lanciformibus, uninervatis 1.8 mm. longis, 0.8 mm. latis; *labello* elliptico-lanceolato, trinervato, basi tantum bicalloso, 1.8 mm. longo, 0.7 mm. lato; *columna* gracile, obconica, more generis longiuscule bibrachiata; *anthera* nondum notata.

*Habitat*: Brasil, Río Grande do Sul, pr. Canela, 900 m.s.m. Leg Eunice Ritcher s/n - HOLOTIPO HB-2145.

Una de las especies más pequeñas de *Capanemia*, caracterizada por la forma del labelo que no tiene similar en el género.

Sépalo dorsal lanciforme, carinado sólo en el tercio superior, 2 mm. x 0.6 mm. Sépalos laterales asimétrico-lanceolados. Labelo elíptico-lanceolado con dos pequeños callos cerca a la base, 1.8 mm. de largo x 0.7 mm. de ancho.

One of the smallest species of *Capanemia*, characteristic in the shape of the lip which does not have a similar in the genus.

Dorsal sepals lanciform, carinate only at the upper third, 2 mm. long, 0.6 mm. broad. Lateral sepals assimetric-lanceolate. Lip elliptic-lanceolate with two small calli near the base, 1.8 mm. long, 0.7 mm. broad.

PLATE III

