

Nuevas especies de orquídeas de Bolivia (3)

"
"
"
"

"

"

"

"

"

Catasetum interhomesianum R. VÁSQUEZ & C. DODSON sp. nov.

Floribus atrovinosis labello saccato parvo lobis labelli lateralibus denticulatis erectis et lobo mediano triangulato lingulato differt.

Planta epífita, pequeña para el género, hasta 25 cm de altura. **Seudobulbos** agregados, fusiformes, relativamente cortos, hasta 10 cm de largo, 4 cm de diámetro. **Hojas** 7-10 por pseudobulbo, deciduas, oblongo-lanceoladas, hasta 15 cm largo, 5 cm de ancho. **Inflorescencia** masculina arqueada, hasta 20 cm largo; brácteas triangulares, hasta 10 mm de largo. **Flores femeninas** no vistas. **Flores masculinas** más o menos 15, resupinadas. **Brácteas florales** 7-10 mm largo, angostamente triangulares. **Pedicelo**

3-3.5 cm largo. **Sépalos** oblongo-lanceolados, vinosos, agudos, cóncavos, los márgenes apicales involutos; sépalo dorsal erecto, 28 mm largo, 8 mm ancho; sépalos laterales reflexos, ligeramente oblicuos, 29 mm largo, 9 mm ancho. **Pétalos** erectos, oblongo-lanceolados, más claros que los sépalos, con máculas vinosas en la superficie adaxial, 28 mm largo, 8 mm ancho, el ápice atenuado. **Labelo** vinoso, pequeño, 8 mm largo, 9 mm de ancho en posición natural, sacado, 3-lobado, lóbulos laterales erectos con el margen frontal denticulado; lóbulo medio ligulado, el margen entero. **Columna** vinosa clara, brillante, con máculas pequeñas, vinosas, oscuras, erecta, 15 mm de largo, rostrada, con un par de antenas convergentes, 6 mm de largo. **Antera** rostrada, 7 mm de largo; polinario 7 mm de largo. **Polinios** 1 par.




Fig. 1: *Catasetum interhomesianum*

Dib.: R. Vásquez

NUEVAS ORQUIDEAS

TIPO: BOLIVIA: PANDO: Prov. Federico Román: El Carmen, Río Negro, ca. 180 m, 10°15'S, 65°41'W, epífita en bosque de ribera, 15 Ago. 1997, O. Moreno S., (Holótipo: LPB; isótipo: VASQ). Fig. 1.

ETIMOLOGÍA: Se nombra esta especie en honor de la empresa alemana *Interhomes* por su aporte al estudio y la conservación de las orquídeas de Bolivia.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGIA: Endémica. Conocida únicamente de las riberas del Río Negro en el departamento de Pando. Es una epífita escasa en selva siempreverde de llanura amazónica. Florece entre marzo y abril al final de la temporada de lluvias.

DIAGNÓSTICO: *Catasetum interhomesianum* se destaca por sus flores de color vinoso oscuro, el labelo cóncavo, pequeño en relación con los sépalos y pétalos. Los lóbulos laterales erectos y denticulados y el lóbulo medio triangular, linguiforme son las características más destacadas de esta especie.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Según el Valor Nacional de Conservación (IBISCH 1998) *Catasetum interhomesianum* está dentro la categoría vulnerable (VNC = 56 {32+16+0+4+4+E}), pero esta situación puede cambiar si se amplía, con nuevos registros, la distribución de esta especie.