

lobus medius obtuse rhombeus, longe maximus; cri-
stae illae baseos laterales externae simulatque de-
scendentes hanc in laminam erectae, auctae, den-
tiformes, quasi bifidae duas in laminas, altera in-
terna oblonga apice libero acutiuscula, erecta, al-
tera lateralis, dentiformis, prostrata; cristulae simi-
les pusillae in lobis lateralibus dentiformibus supi-
nae. Gynostemium breve, crassum, lateribus et
dorso obtusissimum, papillosum. Androclinium tri-
angulum, submarginatum, rostellum retusum. Alae
duae obtuse triangulae, carnosae, angulo libero in
basi inferiori descendentes, ab angulis androclinii
anticis involutae (?ex sicco), ad gynostemii me-
dium, dein margines anteriores carinati; basi ima
connati cum basi phyllorum lateralium internorum,
carina a media basi in cristam excurrens per rha-
phen phyllorum lateralium externum, pro labelli
basi recipienda. Stigmatis fovea transversa, linea-
ris, minuta; sub rostello abscondita. Anthera —
Epiphyta ebulbis, habitu Kefersteiniarum, foliis ob-
longo lanceolatis cuneatis, acuminatis, membrana-
ceis. Pedunculi capillares, uniflori, flores illos
Cyrtoperae Woodfordi non aequantes. — Genus
ob labellum cum gynostemio haud articulatum, ta-
men non apus, Steniae quodammodo affine visum
dicavi ill. Chaubard de flora europaea meritissimo.
C. surinamensis. Vom Hrn. Universitätsgärtner K e-
gel entdeckt bei Geiersvlyt in Surinam. Jeden-
falls im Van Houtteschen Garten.

Chaubardia.

Perigonii membranacei phylla 5 lanceolata,
acuta, externa margines internorum vix imbrican-
tia, lateralia ima basi connata. Labellum a crista
gynostemii basin anteriorem descendente per raphén
phyllorum lateralium externorum dilatatum in lami-
nam utrinque extrorsum obtusatam subcorneam ex-
cavatulam nervis quinque cristularum instar eleva-
tis; dein explanatum in laminam valde membrana-
ceam, omnino cum parte basilari non articulatum,
trilobatum; lobi laterales divaricati, semifalcati, parvi,