

1035. **Chloraea patagonica** Ph. [*Chi. spica multiflora*];
sepalo superiore lanceolato, lateralibus linearibus, apice in-
crassatis, mediano lanceolato; pétalis falcatis, margine con-
cavo verrucoso-varicoso; labello rhombeo, obsolete trilobo,
loborum lateralium venis varicosis, apice paucidentato, centro
setis falcatis obsito, lobi terminalis triangularis margine den-
tato, varicoso.

In planicie patagonica prov. Valdiviae opposita legit orn.
G. Cox. — Pars inferior plantae deficit. Spica 6 poll. longa,
circa 18-flora; bracteae inferiores 20 lineas longae, reliquiae
sensim minores, semper ovarium superantes, sed flore bre-
viores. Sepalum superius 13 lin. longum, fere 4 lin. latum,
valde acuminatum, 7-nervium, venis parum anastomosantibus;
lateralia 11 $\frac{1}{2}$ lin. longa, fere 2 lin. lata, tri- vel quadri-
nervia, in parte incrassata subverrucosa. Petala sepalis aequi-
longa, versus apicem fere 3 lin. lata, 5-nervia; nervis late-
rales extus semipinnatim ramosi, reliqui versus apicem sur-
cati. Labellum 7 $\frac{1}{2}$ lin. longum, fere 7 lin. latum; venae
circa 7 processus falciformes gerunt; dentes lobi mediani bre-
ves, angusti, obtusi.