

***Cischweinfia kroemeri* sp. nov. R.VÁSQUEZ & DODSON**

A C. jarae Dodson & Bennett *dispositione formaeque florum, antheris glabris, lamellis calli ovarioque corto-pubescentibus differt.*

Planta epífita, hasta 20 cm de alto. **Seudobulbos** alargados, ligeramente complanados, unifoliados, 3.3 cm de largo, 6 mm de ancho, la base parcialmente cubierta por vainas imbricadas, las vainas basales conduplicadas, agudas, las superiores foliadas, articuladas, hasta 11 cm de largo. **Hoja** apical, linear, atenuada hacia el ápice, conduplicada hacia la base, 17 cm de largo, 8 mm de ancho. **Inflorescencia** basal, de la axila de la vaina superior, erecta, 4-4.5 cm de largo, pauciflora. **Brácteas florales** triangulares, conduplicadas, 3-5 mm de largo. **Ovario** pedicelado, curvado, con tricomas cortos, 16 mm de largo. **Flores** 3-4, blanco-amarillas.

Sépalos libres, carnosos, lanceolados, los ápices cuculados, carinados, ligeramente convexos, 6 x 2.5 mm. **Pétalos** parecidos a los sépalos, 6 x 2 mm. **Labelo** orbicular, 6-7 mm de largo, 5 mm de ancho cuando se lo extiende, carnoso en la parte media, más delgado hacia el margen y el ápice, lobulos laterales parcialmente cubriendo a la columna, el ápice acuminado, conduplicado; la base bruscamente aternuada, cóncava y carnosa; callo formado por 2 lamelas inconspicuas, con cortos tricomas en la parte media. **Columna** corta, cilíndrica, 5 mm de largo, el ápice cuculado, crenado, el vientre con 2 láminas dentiformes. **Antera** 1.5 mm de largo, inserta. **Polinario** compuesto por 2 polinios globosos, estípite laminado y viscidium alargado.

Tipo: BOLIVIA: LA PAZ: Prov. Sud Yungas: Alto Beni, Colonia Tarapacá, Parcela II, 15°32'S, 67°21'W, 625 m, 16 Dic. 1998, KROEMER, T. & ACEBEY A. 192 (Holotipo:




Fig. 1: *Cischweinfia kroemeri* sp. nov.

Dibujo: Roberto Vásquez

NUEVAS ESPECIES DE ORQUIDEAS

LPB; Isotipo: Herb. Vasquezianum). Fig. 1.

Etimología: Se nombra esta especie en honor a su descubridor, el botánico alemán Thorsten Kroemer.

Distribución y Ecología: Conocida únicamente de la provincia Sud Yungas del departamento de La Paz. Crece en bosque siempreverde, poco alterado, de 20-25 m de altura.

Valor Nacional de Conservación (V.N.C.) (según IBISCH 1998): $(32+8+0+4+4) = 48$ ci No amenazada, pero merece especial atención nacional.

Observaciones: *C. kroemeri* se parece a *C. jarae* DODSON & BENNETT en la forma y disposición de sus flores pero difiere por la ausencia de tricomas en la antera y la presencia de tricomas cortos en el ovario y el callo del labelo.