

Craniches Sw.

Craniches Alfredii Schltr., nov. spec.

Herba verosimiliter terrestris, c. 30 cm alta; radicibus flexuosis, pilosis; folio brasiliari singulo vel subsingulo (ut videtur interdum secundo reducto evoluto), graciliter petiolato, lamina ovato-oblonga, acuminata, basi cordata, glabra, superne albo-picta, usque ad 6,5 cm longa, infra medium ad 2,2 cm lata, petiolo gracili, c. 3,5 cm longo; soapo erecto vel adscendente, gracili, tereti, e basi glabrata apicem versus breviter glanduloso-puberulo, vaginis 4—5 arcte amplectentibus, distanter obsesso, supra basin usque ad 2 mm diametente; racemo sublaxe 12—18-floro, oblongoideo, c. 3,5 cm longo, 1,5 cm diametente; bracteis erecto-patentibus, lanceolatis, acuminatis, ovario fere 3-plo brevioribus; floribus erecto-patentibus, more generis inversis, in genere inter minores; sepalis anguste oblongo-ellipticis, subacutis, vix 3 mm longis, intermedio concavulo, 3-nervio, lateralibus obliquis, vulgo 2-nerviis; petalis erecto-patentibus linear-ligulatis, obtusiusculis, glabris, supra medium sensim paululo dilatatis, margine glabris, quam sepala paulo brevioribus; labello brevissime unguiculato, circuitu oyato-elliptico, obtusiusculo, basi subcordato, apice orbiculato-truncato, 3-nervio et papulis sparsis irregularibus in dimidio inferiore ornato, petalis subaequilongo; columna recta, brevi, glabra, generis; ovario glandulis sessilibus sparsis donato, fusiformi-cylindracea, glabro, c. 7 mm longo.

Costa Rica: Vulcan Barba, c. 2100 m. — A. et C. Brade no. 1262, blühend im Januar 1909.

Bei den überaus komplizierten Verwandtschaftsverhältnissen innerhalb der Gattung ist es schwer, sich über ihre Beziehungen zu äußern. Ich glaube selbst, daß die Art am besten neben *C. diphylla* Sw. untergebracht würde.