

Craniches Curtii Schltr., nov. spec.

Herba terrestris, erecta, usque ad 40 cm alta; radicibus flexuosis, carnosulis, vulgo dense pilosis; foliis radicalibus in specimine nostro 2, erecto-patentibus, graciliter petiolatis, lamina ovato-elliptica, acuminata, basi rotundata, usque ad 9 cm longa, medio fere usque ad 5 cm lata, petiolo canaliculato ad 7 cm longo; scapo erecto, substricto, folia multoties superante, vaginis c. 7 acuminatis magna pro parte obtecto, tereti, e basi glabrata apicem versus sensim glanduloso-puberulo, vaginis 8—9 arcte amplectentibus omnino obtecto, c. 4 mm diametiente; racemo erecto, cylindraceo, c. 9 cm longo, 2 cm diametiente; floribus erecto-patentibus, more generis inversis, vix inter mediocres; bracteis lanceolatis, acuminatis, dimidium ovarii bene excedentibus; sepalis oblongis, obtusiusculis, glabris, 3,5 mm longis, intermedio concavulo, 3-nervio, lateralibus obliquis; petalis falcato-ligulatis, obtusis, uninerviis, basin versus angustatis, margine sparsim longiciliatis, quam sepala subaequilongis; labello subcucullato-concavo, rhombeo-suborbiculari, 3,25 mm longo et lato, nervis 3 medianis paulo incrassatis ornato, nervis c. 7 latere utrinque rectangulariter patentibus additis; gynostegio mediocri, petalis fere 2-plo brevior, rostello digitiformi, mediocri; ovario fusiformi, subsessili, glabro, c. 7 mm longo.

Costa Rica: Tablazo, c. 1900 m ü. M. — A. et C. Brade no. 1261, blühend im Dezember 1908.

Die Art ist wohl am besten neben *C. ciliata* Kth. unterzubringen, aber kräftiger im Wuchs und hat breitere Petalen mit längeren, aber spärlicheren Wimpern und eine dichtere Nervatur auf der Lippe.