

334. **Craniches nigrescens** Schltr., nov. spec.

Herba gracilis, erecta, 12—30 cm alta, sicca nigrescens; radicibus fasciculatis, crassiusculis, teretibus, puberulis; folio basali singulo, erecto-patente, graciliter petiolato, lamina ovata vel oblonga, acuta vel breviter acuminata, basi rotundata vel subcordata, glabra, 2,2—4,5 cm longa, infra medium 1,2—2 cm lata, petiolo sulcato glabro, basi paulo dilatato, 1,3—6 cm longo; scapo stricto vel parum flexuoso, vaginis 5—8 arcte amplexantibus, acuminatis, glabris, dissitis obsesso, tereti, basi glabro apicem versus dense glanduloso-hispidulo; racemo subdense multifloro, cylindrico, usque ad 2,5 cm longo, c. 1 cm diametiente; bracteis erecto-patentibus, lanceolatis, acuminatis, glabris, ovario paulo brevioribus; floribus in genere inter minores, erecto-patentibus, more generis inversis; sepalis lanceolatis, subacutis, glabris, 2,5 mm longis, lateralibus obliquis; petalis linearibus, obtusis, apicem versus paululo dilatatis, obliquis, sepalis subaequilongis; labello brevissime unguiculato, lamina ovata subacuta, basi rotundata, concava, glaberrima, toris 2 oblongis, incrassatulis, sparsim impresso-punctatis ornata, 2,25 mm longa, infra medium 1,25 mm lata; columna perbrevis, glabra, rostello bene elato; ovario gracili, cylindrico, sessili, pilis retrorsis glanduloso-hispidulo, 3,25 mm longo.

Costa-Rica: Ohne nähere Standortsangabe. — A. Tonduz.

Die Art ähnelt habituell der *C. pilosa* Fawc. & Rendle *C. guatemalensis* Schltr. und *C. diphylla* Sw. am meisten, ist aber durch die Blütencharaktere von allen diesen gut verschieden. Leicht ist sie zu erkennen durch die beiden eigenartig punktierten Polster auf der Lippenplatte. Die ganze Pflanze trocknet vollständig tiefschwarz.