
VII. *Orchidaceae novae et criticae.*

Auctore R. Schlechter.

(Originaldiagnosen.)

Decas XXXV.

341. ***Craniches Pittieri* Schltr., nov. spec.**

Gracilis, erecta, c. 25 cm alta; folio basilari solitario, graciliter petiolato, erecto-patente, lamina ovata, acuminata, basi leviter cordata, utrinque glabra, reticulato-nervosa, 4,5 cm longa, infra medium 2,5 cm lata, petiolo leviter sulcato, basi dilatata vaginante, glabro, c. 5 cm longo; scapo gracili, tereti, vaginis c. 6 alte amplectentibus, acuminatis, dissitis obpresso, basi glabro, spicam versus glandulosso-puberulo; spica subdensa, c. 20-flora, c. 4,5 cm longa; bracteis lanceolatis, acuminatis, ovario paulo brevioribus vel subaequilongis; floribus in genere inter minores, inversis, illis *C. muscosae* Sw. fere aequimagnis; sepalis ovato-oblongis, obtusiusculis, glabratis, 0,3 cm longis, lateralibus obliquis; petalis oblique ligulatis, obtusiusoulis, margine anteriore supra medium paulo dilatatis, glabris, sepalis subaequilongis; labello e basi vix unguiculata subauriculata late rhombeo-ovali obtuso, concavulo, nervis 5 sparsim papulosis ornato, 2,5 mm longo, medio fere 2 mm lato; columna more generis perbrevi, glabra, rostello dactyliformi, satis longo; anthera ovata, subcordata, glabra, antice obtusiuscula; ovario sessili cylindraceo, sparsim glandulosso-puberulo, c. 0,4 cm longo.

Costa-Rica: Bei La Division, c. 2270 m ü. d. M. — H. Pittier no. 10480, blühend im Januar 1879.

Anfangs glaubte ich *C. ciliata* H. B. et Kth. vor mir zu haben, doch stellte sich heraus, dass beide Arten vollständig verschieden sind soweit die Blüten in Betracht kommen, obgleich sie eine gewisse habituelle Übereinstimmung zeigen.