

**372. *Microstylis blephariglottis* Schltr., nov. spec.**

Epiphytica, erecta, 20—30 cm alta; rhizomate valde abbreviato; radicibus flexuosis, villosulis; caule abbreviato, carnosulo, vix 2 cm longo, dense 6—8-foliato; foliis erecto-patentibus, lanceolato-ligulatis, oblique acuminatis, basin versus paulo angustatis, glabris, tenuibus, 5,5—10 cm longis, supra medium 0,8—1,5 cm latis; racemo dense multifloro, cylindraceo, elongato, pedunculo foliis vix aequilongo; bracteis erecto-patentibus, lanceolatis, acuminatis, ovario pedicellato paulo brevioribus; floribus in genere vix mediocribus, inversis, erecto-patentibus; sepalis oblongis, obtusis, glabris, 3,75 mm longis, lateralibus obliquis; petalis oblique linearibus, obtusis, glabris, sepalis subaequilongis; labello ovali, obtuso, basi subcordato, margine papulis subulatis patentibus dense ciliato, 3,75 mm longo, medio fere 2,25 mm lato; columna brevi, glabra; ovario pedicellato glabro, 4—5 mm longo.

Costa-Rica: Brade.

Panama: An Baumstämmen in feuchten Wäldern der oberen Caldera-Wasserscheide, oberhalb El Boquete (Chiriqui), 1650—1925 m ü. d. M. — W. R. Maxon (B. S. P. C. Z. no. 5667), blühend im März 1911.

Die Art ist mit keiner der bisher beschriebenen näher verwandt und bildet eine eigene Sektion, die ich *Blephariglottis* nennen will.