

Sauroglossum nigricans Schltr. n. sp.

Terrestre; erectum, siccum nigricans, c. 20 cm altum; radicibus carnosis, fasciculatis, villosis; foliis basilaribus c. 4—5 rosulatis, erecto-patentibus, petiolatis, glabris, petiolo c. 2 cm longo, lamina ovali-elliptica, acuminata, 3—3,5 cm longa, medio fere 1,5—1,8 cm lata; scapo erecto, strictovaginis paucis arcte et alte amplectentibus, a cuminatis, distantibus obpresso, apicem versus glanduloso-puberulo; racemo laxe plurifloro (5—8-flora) ad 5 cm longo; bracteis lanceolatis, acuminatis, ovario fere aequilongo; floribus illis *S. cranichoidis* Ames fere aequimagnis, glabris; sepalis ligulatis, obtusiusculis, 7 mm longis, lateralibus obliquis basi margine anteriore paulo dilatata, cum pede columnae mentum obtusum breve formantibus; petalis anguste ligulatis, obtusiusculis, sepalo intermedio margine interiore arcte agglutinatis, quam sepala paululo brevioribus, obliquis; labello circuitu oblongo-quadrato, angulis basilaribus subhastabo-productis, incurvis, apice contracto e sursum in lobum anticum reniformem parvulum expanso, 8 mm longo; columna gracili, glabra, 5 mm longa, rostello erecto, longe triangulo; ovario sessili, glabro, c. 5 cm longo.

Costa Rica. — H. Pittier.

Die Gattung *Sauroglossum* habe ich hier angenommen, da ich der Ansicht bin, daß *Spiranthes* in seiner jetzigen Umgrenzung eine recht unnatürliche Gattung ist, die entschieden aufgeteilt werden muß. Die schwarze Färbung nach dem Trocknen ist in der Gattung sehr ungewöhnlich.