

*C. pachydaetylon* Schltr., nov. spec.

Epiphyticum, erectum, habitu praecedentis; pseudobulbis fusi-  
formibus, usque ad 15 cm longis, medio fere ad 2,5 cm diametentibus,  
c. 8-foliatis; foliis erecto-patentibus, plicatis, illis *C. Eggertoniani* Ldl.  
similibus, glabris, textura tenuibus; inflorescentiis in axillis foliorum  
superiorum natis, dependentibus, masculis dense 10—20-floris, usque ad  
25 cm longis, femineis abbreviatis vulgo bifloris; floribus masculis tenuibus,  
inversis; bracteis reversis, oblongis, acuminatis, ovario pedunculato multo  
brevioribus; sepalo intermedio (infero) lanceolato-ligulato, obtusiuscule  
acuminato, 2,5 cm longo, lateralibus deflexis, involutis, oblique elliptico-  
lanceolatis, acuminatis, c. 1,8 cm longis; petalis oblique elliptico-lanceo-  
latis, acuminatis, quam sepala lateralia valde similibus; labello ex ungue  
lineari-ligulato, ima basi calloso, in laminam suborbicularem, concavam,  
obtusè octodactylam, antice in ligulam productam extenso, in basi laminae  
appendicibus 2 dactyliformibus, obtusis ornato, in basi ligulae apicalis  
processu brevi dactyliformi aucto, ungue c. 6 mm longo, lamina cum ap-  
pendicibus, sed lingua apicali exclusa 1,1 cm longa et lata, lingua apicali  
c. 5 mm longa; columna pergracili, curvata, apicem versus paululo dila-  
tata, c. 2,5 cm longa, apice in lobulos 2 androclinii extensa, glabra; ovario  
pedicellato, glabro, genuflexo, c. 1,2 cm longo, gracili.

Floribus femineis carnosulis, sepalis petalisque lanceolatis, acu-  
minatis, 2,4 cm longis, lateralibus obliquis; labello elliptico-lanceolato,  
subsessili, supra basin calloso-incrassato, petalis aequilongo; columna  
leviter curvata, crassiuscula, semitereti, c. 1,4 cm longa; ovario subrecto,  
cylindraceo, glabro, c. 2,5 cm longo.

Panama: Chiriqui, c. 5000 Fuß ü. M., am Vulkan — no. 159.

Wie die vorhergehende Art gehört *C. pachydaetylon* Schltr. in den  
Formenkreis des *C. Eggertonianum* Ldl. und seiner Verwandten. Charak-  
terisiert ist es durch die Blütenfärbung, die stumpfen, dicken nicht sehr  
kurzen Auswüchse des Labellums, von denen allerdings der vor der Vorder-  
ligula stehende hier auffallend reduziert ist, und durch die verhältnis-  
mäßig kleinen weiblichen Blüten.

Über die Blütenfärbung liegen folgende Angaben Mr. Powells vor:  
(Männliche Blüten): „Sepals and petals white with a faint purplish shade,  
which becomes more pronounced upon fading; the lip is clawed with  
11 processes, of which 9 are chalky-white, the two inner ones are green  
with white points; the slender column is green with a white apex. (Weib-  
liche Blüten): Flower pale green in all its parts, except the top of labellum,  
which is ivory white.“