

*C. Powellii* Schltr., nov. spec.

Pseudobulbis foliisque mihi nondum notis; racemo masculino dependente, laxe plurifloro, verosimiliter supra 20 cm longo; bracteis recurvis, oblongis, obtusiusculis, ovario pedicellato subtriplo brevioribus; floribus in sectione mediocribus, more subgeneris inversis, glaberrimis; sepalo intermedio deflexo, oblanceolato-ligulato, subacuto, concavulo c. 2,4 cm longo, lateralibus oblique oblongo-falcatis, acutis vel breviter acuminatis, margine leviter undulatis, ab apice involutis, explanatis c. 2 cm longis; petalis quam sepala lateralia bene similibus, sed paulo minoribus, ad 1,7 cm longis; labello ex ungue anguste ligulato, dimidio inferiore incrassato, medio fere constricto c. 6 mm longo in laminam circuitu subreniformem, antice in ligulam lanaceolato-linguiformem, acutam, 5 mm longam productam dilatato, lamina laterè utrinque processibus 4 (quorum 2 inferioribus apice incurvos), dactyliformibus ornata, basi ligulis 2 oblongis antrorsum incurvis aucta, in basi ligulae antice ligula brevi incurvula ornata, labello toto c. 1,4 cm longo, lamina (ligula apicali inclusa) c. 8 mm longo, medio appendicibus inclusis c. 9 mm lata, intus excavata; columna pergracili valde curvata sectionis, explanata c. 2,7 cm longa; ovario more sectionis genuflexo, pedicellato, 2 cm longo, glabro.

Panama: Ohne nähere Herkunftsangabe — no. 111.

Von dieser interessanten Art erhielt ich von Mr. Powell leider nur ein Teilstück einer Infloreszenz mit der Angabe, daß sie von R. A. Rolfe als das echte *C. Dianae* Rehb. f. erklärt worden sei. Ein Vergleich mit der Beschreibung zeigt aber deutlich, daß wir hier nicht diese Art vor uns haben, sondern eine noch unbeschriebene.

Leider fehlen bisher noch Materialien der vegetativen Teile, sowie Angaben über die Länge der Infloreszenz und die Färbung der Blüten. Ich kann auch nicht einmal die genauere Herkunft der Pflanze angeben.