

30. *Chondrorhyncha maculata* Garay, sp. nov.

Epiphytica, caespitosa, usque ad 12 cm. alta; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; caulinibus valde abbreviatis; foliis ellipticis vel lanceolato-ellipticis, acutis vel subacuminatis, basin versus conduplicato-subpetiolatis, cum vaginis hyalino marginatis articulatis, usque ad 10 cm. longis, 2.5 cm. latis; inflorescentia gracili, tereti, arcuata, usque ad 3 cm. longa, uniflora; bractea late perfoliata, suborbiculari, obtusa, 5 mm. longa; floribus carnosulis, pro genere satis parvis; flavo-virescentibus cum labello atropurpureo maculato; sepaloo postico anguste ovato-elliptico, concavo, obtuso, dorsaliter obscure carinato, 16 mm. longo, 6 mm. lato, sepalis lateralibus valde reflexis, haud obliquis, anguste ovatis, obtusis, dorsaliter obscure carinatis, 20 mm. longis, basin 7 mm. latis; petalis obliquis, ellipticis, rotundatis, 16 mm. longis, 8 mm. latis; labello e cuneata basi late ovato, antice rotundato, paululo emarginato, concavo, undulato, callo infra medium transverso, bilobato ornato, 20 mm. longo, 16 mm. lato; columna satis gracili, subclavata, in pedem longum producta, usque ad 10 mm. longa; ovario subcostato, cum pedicello 10 mm. longo.

COLOMBIA, Depto. de Caldas, Santuario Caldas, 1800 meters alt. Coll.: G. Escobar no. 543. Type! (AMES).

Esta nueva especie se asemeja en su apariencia general a la *C. Reichenbachiana* Schltr. de Costa Rica y Ecuador, pero esta tiene labelo y callosidad muy diferentes. (Ilustración a color en la pág. 155).

— * —

This new species in general appearance, resembles *C. Reichenbachiana* Schltr. from Costa Rica and Ecuador, but it has a very different lip and callosity.

