

Dichaea acroblephara Schltr., nov. spec.

Epiphytica, erecta vel adscendens, usque ad 14 cm longa; radicibus basilaribus tantum, filiformibus, flexuosis, glabris; caulibus simplicibus, leviter compressis, dense foliatis, vaginis foliorum arcte amplexentibus, striato-nervosis omnino obtectis, c. 4 mm latis; foliis patentibus, anguste linearibus, valde acutis, apice minutissime ciliolatis, caeterum glabris, 3—4 cm longis, medio fere 1,5—4 mm latis; inflorescentiis more generis unifloris, erecto-patentibus, pedunculo basi bivaginulato, c. 5—6 mm longo; bractea cucullato-ovata, ovarium perbreve c. 3—4-plo superante; flore in genere mediocri, glabro, albido, pallide violaceo-maculato; sepalis ovato-lanceolatis, acuminatis, 5-nerviis, c. 4,5 mm longis, lateralibus obliquis; petalis sepalis similibus, acutis, 5-nerviis tamen paululo brevioribus et angustioribus; labello e basi breviter oblongo-cuneata dimidio superiore semiorbiculari-sagittato, obtusiusculo, 3,75 mm longo et lato, leviter concavulo, margine laminae minutissime ciliolato, auriculis basilari-bus retrorsis, subulatis, acutis, c. 1 mm longis; columna brevi, c. 2 mm alta, ligula infra stigmatica decurva minute puberula; ovario perbrevis dense verruculoso muriculato, c. 1,5 mm longo.

Costa Rica: San Jeronimo — C. Wercklé no. 22, blühend im Mai 1921; Carillo, c. 400 m — A. et C. Brade no. 1173, blühend im Juni 1909 (siehe unten Seite 154).

Die Art dürfte mit *D. brachypoda* Rehb. f. am nächsten verwandt sein, unterscheidet sich aber durch schmalere Blätter, den kürzeren Lippen-nagel und die vorn sehr fein und kurz gewimperte Lippenplatte.