

Dichaea camaridioides Schltr., nov. spec.

Epiphytica, usque supra 15 cm longa, verosimiliter patula vel ascendens; caulibus simplicibus, dense foliatis, vaginis foliorum minute papilloso-ciliolatis, compressis omnino obtectis, 3—4 mm latis; foliis patentibus, linearibus, acutis, illa *Camaridii brevifolii* Ldl. in mentem revocantibus, glabris, 2,8—4 cm longis, medio fere 4,5—6 mm latis; inflorescentiis axillaribus, abbreviatis, unifloris, pedunculo folii vaginam haud excedente; bractea ovali, acuminata, ovarium breve plus duplo superante; flore in genere medioeri, glabro; sepalis oblongis, acuminatis, 3-nerviis, 6,5 mm longis, margine minute papilloso-ciliolatis, lateralibus obliquis; petalis oblique oblongo-ligulatis, acuminatis, uninerviis, quam sepala paululo brevioribus sed angustioribus; labello e basi late obovata in laminam semilunatam, breviter acuminatam, concavam dilatato, auriculis lateralibus retrorsis, anguste falcato-oblongis, obtusis, toto 5,5 mm longo, inter apices auricularum 5,5 mm lato; columna brevi, crassiuscula, c. 2,5 mm alta; ovario breviter cylindraceo, dense appendicibus subulatis, patentibus obtecto, c. 3 mm longo.

Antioquia: Zwischen Santo Domingo und Yolombo, 1800 m. — F. C. Lehmann no. 4259, September 1884.

In der Tracht, besonders durch die linealischen spitzen Blätter erinnert die Art an gewisse *Camaridium*-Arten, z. B. *C. brevifolium* Ldl. Sie ist unter den Spezies, welche ein mit Weichstacheln besetztes Ovarium haben, kenntlich durch die kurz papillös bewimperten Blattscheiden, die Sepalen und Petalen sowie durch die Form des Labellums.