

432. **Masdevallia Sodiroi** Schltr., spec. nov.

Epiphytica (?), gracilis; 20 cm alta; rhizomate abbreviato; radicibus flexuosis, villosulis; pseudobulbis (i. e. caulibus) more generis valde reductis, cylindraceis, c. 2 mm altis, unifoliatis; folio lineari-ligulato, apice obtuse tridentato, basin versus sensim in petiolum longum transeunte, vagina 3—4 cm longa, articulata, folio cum petiolo usque ad 17 cm longo, supra medium usque ad 1,5 cm lato; scapo gracillimo adscendente, in specimine nostro bifloro, usque ad 20 cm longo, flexuoso, glabro, vaginulis 4 arcte amplexantibus dissitis donato; bracteis cuncullatis, apiculatis, pedicello articulado duplo brevioribus; floribus nutantibus in genere mediocribus; sepalis alte in poculum tricarinatum connatis, intus papilloso-puberulis, extus glabris, apicibus liberis semiorbicularibus, in caudam subulato-filiformem, 7 mm longam productis, cauda exclusa 1,3 cm longis; petalis oblique spathulato-ligulatis, glabris, obtusiusculis, apicem versus crenulatis, vix 6 mm longis, intus incrassationibus 2 ovatis crenulatis incumbentibus ornatis, 6 mm longis; labello e basi quadrata lyrato-dilatato, in tertia parte basilari trilobo, lobis lateralibus perbrevis, intermedio anguste elliptico-spathulato obtuso, tricostato, toto 7 mm longo, glabro, basi biauriculato; columna gracili, labello paulo brevior; ovario cum pedicello glabro incurvo, c. 1,5 cm longo.

Ecuador: In silvis occidentalibus montis Pichincha, A. Sodiro s. n., blühend im Juni 1900.

Diese sehr interessante Art hat zu keiner der bisher beschriebenen engere Beziehungen.