

Elleanthus Curtii Schltr., nov. spec.

Suffrutex terrestris, 70—80 cm altus; rhizomate valde abbreviato; radicibus crassiusculis, flexuosis, puberulis; caulibus simplicibus, dimidio inferiore vaginatis, dimidio superiore 4—5-foliatis et vaginis foliorum arcte amplexentibus, striato-nervosis, sparsim furfuraceis omnino obtectis, teretibus, glabris, 3—4 mm diametientibus; foliis erecto-patentibus, elliptico-lanceolatis vel ellipticis, obtusè acuminatis 5—7-nerviis (i. e. nervis primariis), basi rotundato-cuneatis, usque ad 15 cm longis, medio vel infra medium usque ad 6,5 cm latis, textura pro genere haud rigidis; racemo erecto vel suberecto, cylindraceo, basi vaginis 2—3 foliaceis circumdato, usque ad 8 cm longo, bracteis inclusis c. 1,8 cm diametiente; floribus in genere vix inter mediocres, ovario excepto extus subglabris, fide collectorum aurantiacis, erecto-patentibus; sepalis anguste oblongis, acutis, nervo mediano carinato-nerassatis, c. 7 mm longis, vulgo 5-nerviis, lateralibus obliquis; petalis lineari-ligulatis, obliquis, quam sepala aequilongis, ut videtur 3-nerviis; labello explanato circuito suborbiculari-rhombeo, dimidio anteriore crenulato-dentato, basi excavatione semiorbiculari bicallosa donato, 7 mm longo et supra medium aequilato, callis in basi labelli compressis, corpusculum ellipsoideum parvulum formantibus; columna semitereti, apicem versus paulo dilatata, c. 5 mm longa, glabra; ovario brevicylindraceo, furfuraceo, c. 4 mm longo.

Costa Rica: Weg nach Carillo, c. 700 m ü. M. — A. et C. Brade no. 1152, blühend im Juni 1909.

Bisher ist diese Art, welche durch ihre verhältnismäßig breiten Blätter unter den Arten des Landes ziemlich isoliert steht, von keinem anderen Sammler eingeschickt worden.

Sie ist mit den oben beschriebenen *E. Bradeorum* Schltr. am nächsten verwandt. Nach einer Farbenskizze von Herrn C. Brade sind die Blüten und Brakteen orangerot.