

140. **Elleanthus glaucophyllus** Schltr., nov. spec.

Robustus, erectus, ramosus; caule ramisque teretibus bene foliatis, glaucis, vaginis foliorum arcte obtectis; foliis erecto-patentibus lanceolatis acuminatis, plicato-nervosis, glabris, utrinque glaucis, usque ad 16 cm longis, infra medium usque ad 3,5 cm latis; spicis capitiformibus oblongoideis, dense multifloris, sessilibus, ad apices caulum vel ramorum, c. 3 cm longis, c. 2 cm diametentibus; bracteis erecto-patentibus e basi late ovata lanceolato-acuminatis, flores plus minus superantibus; floribus in genere inter majores, erecto-patentibus; sepalis ovatis, extus sparsim squamulosis, 0,8 cm longis, intermedio subacuto, lateralibus obliquis acuminatis; petalis sepalis aequilongis, oblique ligulatis, obtusis, glabris; labello e basi saccato-concava latissime cuneato, marginibus incurvis, antice minute crenulato apice exciso, glabro, basi callis 2 semiglobosis ornato, sepalis fere aequilongo; columna gracili semitereti, glabra, infra medium utrinque subalato-marginata; rostello humili, clinandrio dorso erosulo; ovario squamuoso puberulo, fusiformi, sessili, 0,5 cm longo.

Costa-Rica: In den Wäldern von La Palma, c. 1500 m ü. d. M.
— Brade (Herb. Inst. physico-geogr. nat. costaric. no. 16325), blühend im November 1901.

Durch die bläuliche Färbung der Blätter ist diese Art vor den anderen zentralamerikanischen unschwer zu erkennen. Habituell erinnert sie etwas an *E. aurens* Rchb. f., ist nur mehr verzweigt.