

l. **A. graminifolia** BARB. ROD. l. cit. tab.  
797.

A. caule tenui, erecto, articulato, folioso; foliis distichis, linearibus, acutis, recurvis, vaginantibus; spica parva, juniore bracteis navicularibus distichis imbricatis tecta; floribus minimis, bracteis longitudine; sepalis superiore oblongo-lanceolato, ocuto, concavo, inferioribus latioribus, acutissimis, irregulariter oblongis, basi concavis, apice patulis; petalis spathulatis, erectis, sepalis longitudo; labello integro, gynostemium convoluto, subrotundo, apice recurvo, medio intus transversaliter elevato, basi saccato, cum duobus corpus lenticularibus liberis, marginibus arguté denticulatis, et in apice lateraliter 3 — 4 plicatis. Gynostemio erecto claviformi, dorso subrotundo, intus lateraliter marginato, medio convexo, basi concavo; anthera quadri-locularis, locellis incompletis, triangulari, convexa; stigma subrotundo. Ovario minuto.

HAB. croissant par touffes sur les arbres des endroits humides et sombre des forêts qui bordent la rivière Parahybuna, près Juiz de Fóra, à Minas Geraes, dans une élévation de 670 mètres au dessus du niveau de la mer. Fleurit en Mars.

Tout le périanthe est blanc.