

141. **Elleanthus Tonduzii** Schltr., nov. spec.

Erecta ramosa, rigida, ut videtur c. 1 m alta; caule ramisque teretibus, glabris, bene foliatis, parte superiore c. 0,2 cm diametentibus, vaginis foliorum striato-nervatis obtectis; foliis erecto-patentibus erectisve anguste elliptico-lanceolatis, longe acuminatis, apiculo longo donatis, glabris, textura coriaceis, 5—6,5 cm longis, medio fere 0,7—1 cm latis, nervis subtus bene prominulis; racemis ad apices caulium ramorumque erectis vel patulis, breviter pedunculatis vel subsessilibus, subdense 6—12-floris, circuitu ovatis, quam folia superiora vulgo brevioribus, usque ad 3 cm longis, 1,5 cm latis; rhachi valde flexuosa; bracteis patentibus distichis ovatis vel ovato-lanceolatis acuminatis, flores vulgo superantibus; floribus in genere inter mediocres, fide collectoris rubris; sepalis ovatis acuminatis, glabris, c. 0,5 cm longis, lateralibus basi margine anteriore ampliata mentum obtusum formantibus; petalis sepalis aequilongis, oblique linearibus, apicem versus paululo dilatatis, obtusis, glabris; labello glabro, e basi concava quadrato-cochleato late cuneato, antice rotundato apice leviter sinuato-emarginato, c. 0,4 cm longo, succulo (mento) basali leviter exciso, squamis vel callis 2 parallelis oblongis in ima basi labelli; columna semitereti gracili, glabra; rostello saberecto brevi; ovario sessili, squamulis piliformibus obsesso, fusiformi, c. 0,5 cm longo.

Costa-Rica: Auf Bäumen bei La Palma, c. 1500—1700 m ü. d. M.  
— A. Tonduz no. 9689, blühend im Juli 1895.

Habituell stark an *E. kermesinus* Rchb. f. erinnernd, aber durch die Form des Labellums durchaus verschieden.