

Elleanthus Wercklei Schltr., nov. spec.

Terrestris, erectus, gracilis, 23–45 cm altus; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; caulis gracilibus, simplicibus, dimidio inferiore sparsim vaginatis, dimidio superiore bene 5–7-foliatis, vaginis foliorum arete amplectentibus, striato-nervosis omnino obtectis, 1,5–2 mm diametro; foliis erecto-patentibus, anguste lanceolatis, obtusiuscule acuminatis, basi longius cuneatis, subcoriaceis, glabris, 4,5–7 cm longis, medio fere 7–10 mm latis; racemo erecto, disticho, dense 5–10-floro, circuitu ovali, usque ad 2 cm longo, 1,5 cm lato; bracteis erecto-patentibus, lanceolatis, obtuse acuminatis, concavis, scariosis, inferioribus flores superantibus, superioribus flores fere aequantibus; floribus erecto-patentibus inversis, in genere vix inter mediocres; sepalis ovatis, breviter acuminatis, glabris, 3-nerviis, c. 5 mm longis, lateralibus obliquis; petalis oblique et anguste ligulatis, obtusis, 2-nerviis, quam sepala fere aequi-longis, glabris; labello e basi semiovali-contracta in laminam late reniformem, antice leviter retusam, margine subcrenulatam, c. 4 mm latam explanato, basi callis 2 separatis oblique oblongoideis parallelis ornato, infra medium plica semilunata transversa aucto, c. 4,5 mm longo; columna semitereti, glabra, apicem versus paulo dilatata, 2,25 mm longa; ovario cylindraceo, furfuraceo, c. 3,75 mm longo.

Costa Rica: San Jeronimo, auf der pazifischen Seite, c. 1400 m — C. Wercklé no. 75, blühend im November 1920.

Ich kenne die Pflanze schon seit längerer Zeit in Exemplaren, die C. Wercklé im November 1899 bei La Palma sammelte, deren Blüten aber nicht gut genug erhalten waren. Durch die Tracht und die Form der Lippe ist die Spezies unter den übrigen zentralamerikanischen gut gekennzeichnet.