

E. Powellii Schltr., nov. spec.

· Epiphytica, erecta, florifera usque supra metralis; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; pseudobulbis oblongo-ovideis, apice vulgo bifoliatis, in specimine nostro 6—7 cm altis, infra medium 2,5—3 cm diametentibus; foliis erecto-patentibus, loratis, obtusiusculis vel subacutis, usque ad 60 cm longis, medio usque ad 2,3 cm latis; paniculis gracillime pedunculatis, laxe multifloris, usque ad 100 cm longis, rhachi nudis; bracteis deltoideis, acutis, ovario pedicellato multoties brevioribus; floribus in genere inter mediocres, glabris; sepalis patentibus, anguste oblongis, acutis vel subacutis, 1,6 cm longis, lateralibus obliquis; petalis quam sepala subaequilongis, paulo angustioribus et basin versus magis angustatis, obliquis; labello ex ungue brevissimo alte 3-partito, explanato 1,5 cm longo, inter apices loborum lateralium 1,2 cm lato, carina dupli apicem versus paulo excavata, apice confluente e basi labelli usque in basin lobi intermedii decurrente ornato, lobis lateralibus columnam amplectentibus oblique oblongo-ligulatis, obtusis, ab ungue usque ad apicem 7 mm longis, intermedio ex isthmo brevissimo suborbiculari-ovato, obtusiusculo, margine leviter undulato, 9 mm longo, infra medium 8 mm lato; columna semitereti, recta, juxta stigma leviter dilatata, exauriculata, 8 mm longa; ovario graciliter pedicellato glabro, 2—2,5 cm longo.

Panama: Chiriqui-Bezirk, 4000—5000 Fuß ü. M. — no. 83.

Anfangs hielt ich die Pflanze für die mir noch unbekannt gebliebene *E. profusa* (Rolfe) Schltr., (*Epidendrum profusum* Rolfe) von Mexiko, deren Blütenfärbung sie vollkommen teilen soll. Ein Vergleich mit der farbigen Tafel (Nr. 8551) im Botanical Magazin zeigt aber doch so viele Verschiedenheiten, daß ich mich gezwungen sah, sie als eigene Art anzusehen.