

524. *Epidendrum aberrans* Schltr., spec. nov.

Epiphyticum, pumilum, c. 20 cm altum; caulis approximatis erectis, simplicibus, bene foliatis, teretiusculis, vaginis foliorum arcte amplectentibus dense rugoso-asperatis omnino obtectis, 2,5—3 mm diametentibus; foliis patentibus, ligulatis, obtusiusculis, glabris, 2,5—4,7 cm longis, medio fere 5—11 mm latis; racemis vix pedunculatis, erectis, laxe 4—10-floris, usque ad 4,5 cm longis; bracteis deltoideis, acuminatis, ovario pedicellato multo brevioribus; floribus in genere vix inter mediocres, erecto-patentibus, glabris; sepalis oblongis, obtusiusculis, c. 8 mm longis, lateralibus obliquis; petalis anguste et oblique oblanceolato-spathulatis, obtusis, sepalis subaequilongis; labello e ungue linearī in laminam alte 3-lobatam expanso, lobis lateralibus basilaribus divaricantibus, oblique lanceolato-ligulatis, obtusiusculis, intermedio e ungue quadrato-oblongo antice in lobulos 2 oblique oblongos, obtusos divergentes fisso, callo oblongo antice libero bilobulato in basi laminae usque ad basin lobi intermedii, labello toto 8 mm longo, ungue 3,5 mm longo, inter apices loborum lateralium 7 mm lato, inter apices lobulorum anticum 5,5 mm lato; columna 6 mm alta, quorum 3 mm clinandrii concavi, peralti, margine crenulati; ovario-pedicellato, gracili, glabro, c. 1,1 cm longo.

Guatemala: Bernoulli u. Cario, Dez. 1865.

Eine sehr interessante, abweichende niedrige Spezies aus der Verwandtschaft der kleinen Gruppe, welche Reichenbach fil. einst als eigene Gattung, *Oerstedtella*, beschrieben hat, da sie durch das Klinandrum von den übrigen *Epidendra* sich unterscheiden.