

Epidendrum acrochordonium Schltr. n. sp.

Epiphyticum, erectum, 20—35 cm altum; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; caulibus simplicibus, strictis vel substrictis, teretibus, dense foliatis, vaginis foliorum arcte et alte amplectentibus dense verrucosis omnino obtectis; foliis erecto-patentibus, ovatis vel ovato-oblongis, inaequaliter et obtuse bilobulatis, basi amplexicaulibus, 1,5—2,2 cm longis, infra medium 5—8 mm latis; racemo terminali, laxe 8—15-floro, erecto, usque ad 8 cm longo, pedunculo brevi, vaginulis paucis bracteiformibus obsesso; bracteis linearibus acutis, ovario plus minus brevioribus; floribus parvulis, ut videtur flavidulis, c. 1,5 cm diametentibus; sepalis oblongis, obtusis, patentibus, 7 mm longis, glabris, lateralibus obliquis; petalis oblongo-ligulatis, apicem versus paulo dilatatis, obtusis, sepalorum longitudine; labello e ungue lineari, 4 mm longo, in laminam 3-lobatam expanso, lobis lateralibus basilaribus, parvulis, patentibus, lanceolato-triangulis, acutis, intermedio e ungue oblongo, in lobulos 2 oblique quadrato-flabellatos, margine exteriori crenulato-dentatos expanso cum denticulo apicali, lamina tota 7,5 mm longa, inter apices loborum lateralium 5 mm lata, antice 6,5 mm lata; columna recta, apicem versus ampliata, apice alte 3-lobata, lobis truncatis subintegris; ovario cum pedicello gracili glabro, c. 1 cm longo.

Costa Rica. — A. Tonduz.

Allem Anschein nach eine Art aus der Verwandtschaft des *E. pumilum* Rolfe und *E. Endresii* Rchb. f., aber im Wuchs schlanker und höher, jedoch mit kleineren offenbar gelblichen Blüten.