

186. **Epidendrum cardiophorum** Schltr., nov. spec.

Epiphyticum, pluricaule, usque ad 30 cm altum; rhizomate decumbente, elongato, laxe caulis obpresso; radicibus filiformibus elongatis, flexuosis, glabris; caulis strictis vel substrictis, dimidio inferiore vaginis paucis arcte appressis obpresso, dimidio superiore paulo compressis, laxe 3—4 foliatis; foliis erecto-patentibus, ligulatis, obtusis, glabris. textura subcoriaceis, 4,5—7 cm longis, medio fere 1—1,5 cm latis; spicis erectis, bifariis, vagina basilari 1(—2) bracteiformi; rhachi compressa: bracteis ovatis compressis, dorso acute carinatis, ovarium aequantibus vel paululo superantibus; floribus illis *E. rigidum* Jacq. similibus, ut videtur viridibus vel viridi-brunneis, carnosulis; sepalis patentibus, oblongis, obtusis, glabris. 0,7 cm longis, lateralibus obliquis; petalis oblique linear-ligulatis obtusiusculis, sepalis fere aequilongis, glabris; labello e ungue linearis columnae marginibus omnino adnato, in laminam ovato-cordatam, subacutam, ima basi bicallosam expanso, glabro, ungue c. 3,5 mm longo, lamina c. 4,5 mm longa, infra medium 3,5 mm lata; columna brevi, marginibus unguis labelli adnatis, clinandrio leviter lobulato, glaberrima, vix 0,4 cm longa; ovario subclavato, glabro, c. 0,8 cm longo.

✓ Costa-Rica: In den Wäldern von Tsaki, Calamanca, c. 200 m ü. d. M.  
— H. Pittier no. 9519, blühend im April 1895.

Wie die vorige wohl am besten neben *E. rigidum* Jacq. unterzu bringen, durch die Tracht und die Form der Blütenteile gut getrennt.