

47. *Epidendrum tenuiflorum* Schltr., nov. spec.

Epiphyticum humile, c. 10 cm altum; caule simplici dense foliato, vaginis foliorum arete amplectentibus, verruculosis, striatis omnino oblecto; foliis erecto-patentibus linearibus acutis, glabris, textura coriaceis, 2,3—4 cm longis, superioribus racemo aequilongis; racemo subdense c. 10-floro, basi vagina brevi compressa donato; bracteis lanceolatis acuminatis glabris, erectis, ovario pedicellato multoties brevioribus; floribus erectis vel erecto-patentibus mediocribus; sepalis oblongo-ligulatis obtusiusculis, glabris, textura tenuibus, nervo medio extus incrassato apiculato. 0,9 cm longis, lateralibus subfalcato-obliquis; petalis oblique oblanceolato-linearibus acutis, subfalcatis, sepalis aequilongis; labello e basi breviter lineari-unguiculata trilobo, lobis lateralibus parvulis subfalcato lanceolatis acutis, glabris, vix 0,5 cm longis, intermedio amplo cuneato bilobulato, c. 1 cm longo, glabro, lobulis obtusis rotundatis, callo hippocrepiformi parvulo in basi laminae; columna brevi crassiuscula ungui labelli adnata clinandrio more *E. centropetali* R. f. peramplo trilobulato, lobulis lateralibus brevibus intermedio multo majore late ovato apiculato; anthera cucullata, dorso carinata, apice excisa, lobulis falcato-divaricatis; ovario graciliter pedicellato glabro, pedicello incluso 1,3 cm longo.

Costa-Rica: Bei Aguacaliente, c. 1300 m ü. d. M. — H. Pittier no. 38; blühend am 2. Januar 1888.

Diese interessante Art ist infolge der Säulenbildung unstreitig mit *E. centropetalum* R. f. nahe verwandt.

Die Blüten scheinen rosenrot zu sein.