

27. **E. fractiflexum** BARB. Rod. l. cit. tab. 733.

E. caule pluri-prolifero, fractifexo, cylindraceo, habitus *Rodriguezia rigidæ*, in articulorum cum pseudo-bulbis elongatis-fusiformibus triplo minoribus caulis; bi-trifoliatis, foliis linearis-oblongis, acutis, envaginantibus; scapo erecto, paniculato, pauci-squamato, squameis lanceolatis acuminatis, duplo majore foliis; floribus cum inflorescentia indefinite; sepalis superiore oblongo, acuto basi attenuato, inferioribus oblongo-trapesoidis, acutis, deflexis; petalis multo angustioribus, ligulatis, sub-acutis; labello trilobato, lobulis lateralibus alaeformibus, amplis, cum marginibus crenulatis, lobulo medio multo minore, unguiculato, bifido-apiculato, laciniis divergentibus, cum marginibus dentatis, callis 2, minimis ad basin, oblongis. Gynostemio geniculato, clinandri margine dorso acuta.

HAB. *dans la Province du Ceará où il a été trouvé par feu le botaniste Freire Allemão*. Herb. du Mus. Nat. de Rio de Janeiro n. 1482.

Les fleurs après le sec sont roses, mais je crois qu'elles sont blanches, car certains blancs, ainsi que certains jaunes, après la dissection se rendent roses. Dans l'herbier il n'y a pas aucune note à ce sujet ni sur le temps de la floraison.