

*E. fuscopurpureum* Schltr., nov. spec.

Epiphyticum, 22—25 cm altum; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; caulibus basi vaginata excepta c. 5-foliatis, leviter flexuosis, vaginis foliorum omnino obtectis, paulo compressis, c. 5 mm latis; foliis erecto-patentibus, lineari-loratis, obtusiusculis, carnosu-coriaceis, medianis usque ad 12 cm longis, ad 1 cm latis; inflorescentia terminali, erecta, c. 11 cm longa, pedunculo compresso vaginis 3 dorso acute carinatis obsesso, c. 7 cm longo; bracteis ovatis, obtusiusculis, compressis, dorso acute carinatis, ovarium vulgo paulo excedentibus; floribus mediocribus, carnosus, glabris, fide collectoris fusco-purpureis; sepalo intermedio lanceolato, acuto, 1,4 cm longo, laterali-bus oblique ovatis, breviter acuminatis, nervo mediano extus apicem versus alticarinatis, intermedio fere aequilongis; petalis oblique lineari-ligulatis, obtusiusculis, c. 1,3 cm longis; labelli ungue marginibus columnae omnino adnato c. 8 mm longo, lamina reniformi, basi cordata, apice retusa, integra, basi callis 2 ornata, incrassatione lineari usque ad apicem decurrente interjecta, 9 mm longa, medio fere 1,5 cm lata, columna crassiuscula c. 8 mm longa, auriculis apicalibus oblique semirhombeis; ovario 3-quetro subsessili, glabro, c. 1,7 cm longo.

Panama: Chiriquí, c. 4500 Fuß ü. M. — no. 257, blühend im Oktober.

Eine nahe Verwandte des *E. coriifolium* Ldl., von dem sie durch das Vorhandensein eines regelmäßig beblätterten Stengels mit etwa 5-Blättern, dunkel-purpurne Blüten und das am Grunde mit zwei Calli versehene Labellum unterschieden ist. Die Blätter selbst sollen nicht flach, sondern rinnenartig an den Rändern zusammengebogen (half tubular) sein.