

380. **Epidendrum leucocardium** Schltr., nov. spec.

Epiphyticum, erectum, 15—27 cm altum; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, glabris; caulis simplicibus basi vaginata excepta laxe 4—6-foliatis, vaginis foliorum arcte appressis obtectis, 3—4 mm diametro; foliis erecto-patentibus, ligulatis, obtusiusculis, apice ipso inaequaliter bilobulatis, 5—10 cm longis, 1—1,8 cm latis; inflorescentia more *E. nocturni* Jacq. abbreviata, sessili, pauciflora; bracteis parvulis, ovalibus, obtusiusculis, ovario pedicellato multo brevioribus; floribus succedaneis, magnis, illis *Brassavolae Perrini* Ldl. fere aequimagnis; sepalis linearibus, acutis, glabris, patentibus, c. 3,5 cm longis, lateralibus subfalcato-obliquis; petalis sepalis similibus sed paulo angustioribus, glabris, c. 3,5 cm longis; labello e ungue lineari, in laminam lato ovatam breviter acuminatam, basi cordata bicallosam expanso, 3 cm longo, lamina 2,6 cm longa, infra medium 2,2 cm lata; columna leviter arcuata, 9 mm longa, ungui labelli adnata, clinandrio 5-lobato, lobis anticis rotundatis, 3 posticis acutis; ovario pedicellato, glabro, c. 3,5 cm longo.

Panama: Rio Indio de Fato (in der Provinz Colon), etwa bei Meereshöhe. — H. Pittier (B. S. P. C. Z., no. 4266), blühend im August 1911.

Ich habe diese Art, welche in ihren vegetativen Teilen auffallend mit *E. nocturnum* Jacq. übereinstimmt, nicht bestimmen können und sehe mich daher gezwungen, sie als neu zu beschreiben. Vor *D. nocturnum* Jacq. ist sie unterschieden durch das ungeteilte Labellum. Die Sepalen sind gelb, zuweilen rötlich überlaufen. Die Lippe ist weiss mit gelbem Fleck am Grunde der Platte.