

Epidendrum platytilum Schltr., nov. spec.

Epiphyticum, parvulum, c. 7 cm altum; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; caulibus erectis, c. 5 cm longis, c. 4-foliatis, teretibus, glabris, vaginis foliorum striato-nervosis, arcte amplectentibus omnino obtectis, ad 3 mm diametro; foliis erecto-patentibus, lineari-ligulatis, obtusiusculis, coriaceis, usque ad 3,5 cm longis, ad 5 mm latis; inflorescentia apicali, sessili, ut videtur vulgo uniflora; bractea ovata, parvula, ovario pedicellato multoties brevior; flore in genere mediocri, glabro, illo *E. porpax* Rchb. f. paulo brevior; sepalis adscendentibus anguste lanceolatis, acuminatis, 5-nerviis, c. 9 mm longis, lateralibus obliquis; petalis suberectis, anguste linearibus, acutis, univerviis, quam sepala subaequilongis; labelli ungue lineari, marginibus columnae omnino adnato, c. 3,5 mm longo, lamina transverse late ovali, apiculata, basi subcordata, 5,5 mm longa, medio fere 9 mm lata, basi callis 2 brevibus obtusis, obliquis ornata; columna levissime curvata, apicem versus paulo dilatata, c. 3,5 mm longa, antice latere utrinque bilobulata, lobulis oblique semioblongis, minute serrato-ciliolatis; ovario pedicellato, glabro, c. 1,8 cm longo.

Costa Rica: San Jeronimo — C. Wercklé no. 20, blühend im Mai 1921.

Ich glaube diese Art am besten neben *E. porpax* Rchb. f. unterzubringen, obgleich sie durch ihren aufrechten Wuchs und längere Blätter einen ganz anderen Eindruck macht. In den Blüten zeigt sich aber doch eine nicht zu verkennende Ähnlichkeit.

Leider ist das Material sehr spärlich.