

Epidendrum poaeforme Schltr., nov. spec.

Epiphyticum, pusillum, 5—6 cm altum; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; caulis simplicibus, brevibus, teretiusculis, 2—3 cm altis, laxe 4—6-foliato, vaginis foliorum arcte amplexentibus striato-nervosis omnino obtectis, c. 1—1,5 mm diametro; foliis erecto-patentibus; anguste linearibus, acutiusculis, glabris, usque ad 2 cm longis, vix 1 mm latis; inflorescentia erecta, breviter pedunculata, terminali, pedunculo usque ad 7,5 mm longo, racemo disticho, sublaxe 5—10-floro, usque ad 2 cm longo; bracteis scariosis, erecto-patentibus, flores vulgo paulo superantibus; floribus in genere minutis, glabris, carnosulis, illis *E. miserrimi* Rchb. f. similibus; sepalis lanceolato-linearibus, acutiusculis, nervo medio dorso carinato-incrassatis, vix 3 mm longis, lateralibus obliquis; petalis linearibus, acutis, obliquis, uninerviis, quam sepala paululo brevioribus; labello petalis aequilongo, ungue brevi, linear marginibus columnae adnato, lamina quam unguis plus duplo longiore, ovata, obtusiuscule acuminata, basi late rotundata, carnosula, superne laevi; columna crassiuscula, c. 0,8 mm longa, apice breviter tridentata, ovario subtriquetro, subpedicellato, c. 1,5 mm longo.

Costa Rica: San Jeronimo, c. 1400 m — C. Wercklé no. 17, blühend im Mai 1921.

Die Art ist nahe verwandt mit dem westindischen *E. miserrimum* Rchb. f., das aber ein mehr dreieckiges Labello hat. Unter den zentral-amerikanischen Spezies steht sie dem *E. Selaginella* Schltr. am nächsten, hat aber viel schmälere und längere Blätter.