

68. **Epidendrum polychlamys** Schltr., nov. spec.

Epiphyticum ramosum, decumbens vel dependens; caulibus ramisque arcuatis, basi radicans, vaginis pluribus arcte amplectentibus vestitis, apice 2—3-foliatis, c. 0,6 cm diametentibus, usque ad 30 cm longis; foliis patentibus ellipticis subacutis, glabris, textura coriaceis, 5—12 cm longis, medio fere 2,3—3,7 cm latis; racemo nutante dense 8—15-floro, ambitu oblongo, c. 6 cm longo, basi vaginis pluribus amplis erecto-patentibus sensim in bracteas abeuntibus dense vestito; bracteis patentibus spathaceis dorso ancipiti-carinatis, glabris, coriaceis, floribus aequilongis vel paulo brevioribus; floribus mediocribus flavidis; sepalis ligulatis apiculatis, glabris, 1,3 cm longis, lateralibus paulo obliquis; petalis sepalis aequilongis medio tamen paulo latioribus, obliquis, glabris; labello ungue lineari columnae adnato, petalis aequilongo, glabro, lamina latius oblonga, apice minute apiculata, medio fere c. 1 cm lata, nervo medio per totam laminam incrassato-cariniformi; columna brevi crassiuscula clinandrio latere utrinque unifoveolato, dorso alte exciso, auriculis (lateribus) postice breviter unidentatis, antice rotundatis; ovario breviter pedicellato, clavato, glabro, c. 0,8 cm longo.

Costa-Rica: Auf den Bäumen der Weideplätze von La Palma — A. Tonduz (Herb. Instit. costaric. no. 12492); blühend am 24. August 1898.

In der Gruppe *Amphiglottium*—*Holochila*“ sowohl durch den Habitus wie durch das grosse Labellum leicht kenntlich.