

277. **Epidendrum pseudo-ramosum** Schltr., nov. spec.

Epiphyticum, patulum, 35 cm et ultra longum; rhizomate ramoso, radicante, cauliformi; radicibus filiformibus, elongatis, flexuosis, glabris; caulibus ramisque flexuosis, teretiusculis, bene foliatis, vaginis foliorum arcte amplectentibus omnino obtectis; foliis erecto-patentibus patentibusve lineari-ligulatis, obtusis, apice brevissime et inaequaliter bilobulatis, glabris, 6,5—10 cm longis, 4,5—7,5 mm latis, vaginis minutissime rugulosis, demum striato-nervosis, usque ad 2,5 cm longis; spicis terminalibus, breviter pedunculatis, sublaxe 4—6-floris; vagina et bracteis vaginiformibus late ovalibus, obtusis, amplectentibus, glabris, vagina pedunculo aequilonga, bracteis floribus paulo brevioribus; floribus erecto-patentibus vel suberectis, carnosulis; sepalis oblongis, obtusis, glabris, c. 0,6 cm longis, lateralibus obliquis, intermedio paulo angustioribus; petalis oblique linearibus, obtusis, glabris, sepalis fere aequilongis; labelli ungue lineari, marginibus columnae omnino adnato, 2,5 mm longo, lamina ovato-triangula obtusa, angulis basalibus obtusis, 3,5 mm longa, basi 3 mm lata, glabra, basi medio callo parvulo transverso, trapezoideo, apiculato ornata; columna brevi, glabra, 3,5 mm longa, auriculis lateralibus amplis oblongo-falcatis, obtusiusculis, lobo dorsali abbreviato; ovario sessili cylindraceo, glabro, c. 0,6 cm longo.

Guatemala: Epiphytisch im Hochwalde bei Coban, c. 1350 m ü. d. M. — H. v. Türkheim no. II, 1951, blühend im September 1907.

Eine der vielen Arten aus der Verwandtschaft des *E. ramosum* Jacq., aber von jenem gut unterschieden durch das Labellum und längere Blätter.